

Pour le lundi 5 Novembre 2018
Tous les exercices et problèmes doivent être abordés !

Exercice 1 :

On note E l'espace vectoriel des applications de classe \mathcal{C}^1 définies sur $[0; 1]$ et à valeurs dans \mathbb{R} .

On pose pour $f \in E$, $N_1(f) = |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(t)| dt$ et $N_2(f) = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt$.

1. Démontrer que N_1 définit une norme sur E .
De même, N_2 est une norme sur E , il est inutile de le démontrer.
2. a. Donner la définition de deux normes équivalentes.
b. Démontrer que les deux normes N_1 et N_2 sont équivalentes sur E .
3. Toutes les normes sur E sont-elles équivalentes à la norme N_1 ?

Problème :

Notations

Soit n et p des entiers supérieurs ou égaux à 1. \mathbb{K} désignant le corps des réels ou celui des complexes, on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ le \mathbb{K} -espace vectoriel des matrices à coefficients dans \mathbb{K} ayant n lignes et p colonnes. Lorsque $p = n$, $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ est noté plus simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et est muni de sa structure d'algèbre, I_n représentant la matrice identité.

$0_{n,p}$ désigne la matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et 0_n la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$GL_n(\mathbb{K})$ désigne l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n triangulaires supérieures à éléments dans \mathbb{K} .

Tout vecteur $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de \mathbb{K}^n est identifié à un élément X de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que l'élément de la $i^{\text{ème}}$ ligne de X soit x_i . Dans toute la suite, nous noterons indifféremment $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ aussi bien que le vecteur de \mathbb{K}^n qui lui est associé.

Pour $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $X = (x_i)_{1 \leq i \leq p}$ dans \mathbb{K}^p , on note $(AX)_i$ le coefficient de la $i^{\text{ème}}$ ligne de AX .

Pour toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $\text{Sp}(A)$ l'ensemble des valeurs propres complexes de A et on appelle rayon spectral de A le réel $\rho(A)$ défini par :

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|.$$

Conformément à l'usage, on note N_∞ la norme définie sur \mathbb{C}^n par :

$$\forall X = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{C}^n, N_\infty(X) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

On qualifie de norme matricielle toute norme $\|\cdot\|$ définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant de plus la propriété :

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2, \|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ étant de dimension finie, on rappelle qu'une suite de matrices $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ converge vers une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si la convergence a lieu dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni d'une norme quelconque.

Partie I

1. Rappeler la définition d'une matrice trigonalisable.
2. On se propose dans cette question de démontrer (comme dans le cours) que toute matrice carrée à coefficients complexes est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Pour n fixé, on suppose que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable et on considère une matrice M de $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$.

a. Justifier que M admet au moins une valeur propre.

b. Soit λ une valeur propre de M .

Montrer qu'il existe $Q \in GL_{n+1}(\mathbb{C})$, $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{C})$ et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que :

$$Q^{-1}MQ = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0_{n,1} & N \end{pmatrix}.$$

c. En déduire qu'il existe $H \in GL_n(\mathbb{C})$ et $S \in \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$ tels que :

$$Q^{-1}MQ = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0_{n,1} & HSH^{-1} \end{pmatrix}.$$

d. On pose $R = \begin{pmatrix} 1 & 0_{1,n} \\ 0_{n,1} & H \end{pmatrix}$. Montrer que R est inversible et exprimer R^{-1} .

e. Calculer $R^{-1}Q^{-1}MQR$ et en déduire que M est trigonalisable.

3. Déduire de la question précédente que pour tout n entier supérieur ou égal à 1, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

4. Soit la matrice $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

a. La matrice G est-elle diagonalisable ?

b. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de \mathbb{C}^3 . Montrer que G admet un unique vecteur propre u dont la première composante dans la base \mathcal{B} est égale à 1 et vérifier que $\mathcal{B}_1 = (u, e_2, e_3)$ est une base de \mathbb{C}^3 .

c. On note Q la matrice de passage de \mathcal{B} à \mathcal{B}_1 . Calculer $Q^{-1}GQ$ et en déduire, en s'inspirant de la méthode décrite aux questions **I.2** et **I.3**, $P \in GL_3(\mathbb{C})$ et $T \in \mathcal{T}_3(\mathbb{C})$ telles que $P^{-1}GP = T$.

5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Si T est une matrice triangulaire supérieure semblable à A , que représentent les éléments diagonaux de T ?

6. Soit $S = (s_{i,j})$ et $T = (t_{i,j})$ deux matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

a. Montrer que ST est une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont $s_{1,1}t_{1,1}$, $s_{2,2}t_{2,2}$, ..., $s_{n,n}t_{n,n}$.

b. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, quels sont les éléments diagonaux de T^k ?

7. Montrer que pour toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\rho(A^k) = [\rho(A)]^k$.

8. Montrer que l'application $\|\cdot\| : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{R}$, $A = (a_{i,j}) \mapsto \|A\| = \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{i,j}|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, mais n'est pas en général une norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

9. En admettant l'existence de normes matricielles sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (la suite du problème montrera effectivement cette existence), montrer que pour toute norme N définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe une constante C réelle positive telle que :

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))^2, N(AB) \leq CN(A)N(B).$$

10. Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer que la suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers A si et seulement si la suite $(P^{-1}A_kP)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $P^{-1}AP$.
11. a. Soit $T = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ un élément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, calculer T^k et en déduire que la suite $(T^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge si et seulement si $(|\lambda| < 1)$ ou $(\lambda = 1 \text{ et } \mu = 0)$.
- b. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ diagonalisable. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les valeurs propres de A pour que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ soit convergente.
- c. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable. Montrer que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si $\rho(A) < 1$. Dans ce cas, préciser $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k$.
- d. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\rho(A)$ pour que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.

Partie II

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et N une norme quelconque sur \mathbb{C}^n . On pose : $M_A = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|$.

1. a. Montrer que pour tout $X \in \mathbb{C}^n$: $N_\infty(AX) \leq M_A N_\infty(X)$.
- b. Montrer qu'il existe une constante réelle C_A telle que :

$$\forall X \in \mathbb{C}^n, N(AX) \leq C_A N(X).$$

- c. Montrer que l'ensemble $\left\{ \frac{N(AX)}{N(X)} \text{ tel que } X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} \right\}$ possède une borne supérieure.

On notera dans la suite : $\tilde{N}(A) = \sup_{X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}} \frac{N(AX)}{N(X)}$.

- d. Montrer que : $\tilde{N}_\infty(A) \leq M_A$.
- e. On reprend dans cette question la matrice G introduite en **I.4**.
Déterminer un vecteur X_0 de \mathbb{C}^3 tel que $N_\infty(X_0) = 1$ et $N_\infty(GX_0) = 10$.
En déduire la valeur de $\tilde{N}_\infty(G)$.
2. Soit i_0 un entier compris entre 1 et n tel que $\sum_{j=1}^n |a_{i_0,j}| = M_A$. En considérant le vecteur Y de \mathbb{C}^n de composantes y_j définies par :

$$y_j = \frac{\overline{a_{i_0,j}}}{|a_{i_0,j}|} \text{ si } a_{i_0,j} \neq 0 \text{ et } y_j = 1 \text{ si } a_{i_0,j} = 0$$

montrer que $M_A \leq \tilde{N}_\infty(A)$ et en déduire $\tilde{N}_\infty(A) = M_A$.

3. Montrer :
- a. $\tilde{N}(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0_n$.
- b. $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \tilde{N}(\lambda A) \leq |\lambda| \tilde{N}(A)$.
- c. En déduire : $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \tilde{N}(\lambda A) = |\lambda| \tilde{N}(A)$.
- d. $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \tilde{N}(A+B) \leq \tilde{N}(A) + \tilde{N}(B)$.
- e. $\forall X \in \mathbb{C}^n, N(AX) \leq \tilde{N}(A)N(X)$.
- f. Déduire de ces résultats que \tilde{N} est une norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On lui donne le nom de norme matricielle subordonnée à la norme N .
4. a. En considérant une valeur propre λ de A telle que $|\lambda| = \rho(A)$, montrer que : $\rho(A) \leq \tilde{N}(A)$.
- b. Donner un exemple simple de matrice A non nulle vérifiant $\rho(A) = \tilde{N}_\infty(A)$.
- c. Montrer que si A est nilpotente non nulle, on a l'inégalité stricte : $\rho(A) < \tilde{N}(A)$.

5. Montrer que si $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0_n$, alors $\rho(A) < 1$.

Dans toute la suite du problème, on admettra que, réciproquement, si $\rho(A) < 1$, alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0_n.$$

6. a. Montrer que pour tout k entier naturel non nul : $\rho(A) \leq \left[\tilde{N}(A^k) \right]^{\frac{1}{k}}$.

b. Montrer que pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, $\rho(\alpha A) = |\alpha| \rho(A)$.

c. Soit $\varepsilon > 0$ et $A_\varepsilon = \frac{A}{\rho(A) + \varepsilon}$. Vérifier que $\rho(A_\varepsilon) < 1$ et en déduire l'existence d'un entier naturel k_ε tel que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \left(k \geq k_\varepsilon \Rightarrow \tilde{N}(A^k) \leq (\rho(A) + \varepsilon)^k \right).$$

d. En déduire $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left[\tilde{N}(A^k) \right]^{\frac{1}{k}} = \rho(A)$.